

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2024年8月

慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤

劇薬・処方箋医薬品

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠

トアラセット[®]配合錠「TC」

TOARASET[®] COMBINATION TABLETS「TC」

発売元



中北薬品株式会社

製造販売元



東洋カプセル株式会社

このたび、「トアラセット配合錠「TC」」（有効成分：トラマドール塩酸塩、アセトアミノフェン）につきまして、先発会社の自主改訂に伴い、「使用上の注意」の一部を改訂致しましたので、ご案内申し上げます。ご使用に際しましては、改訂後の各項を十分ご参照くださいますようお願い申し上げます。

・改訂内容（部：改訂箇所）

改訂後			改訂前		
10.2 併用注意(併用に注意すること)			10.2 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
《略》			《略》		
メチルチオニウム塩化物水和物（メチレンブルー）	セロトニン症候群（錯乱、激越、発熱、発汗、運動失調、反射異常亢進、ミオクローヌス、下痢等）があらわれるおそれがある。	メチルチオニウム塩化物水和物のモノアミン酸化酵素阻害作用によりセロトニン作用が増強される。	《該当項目なし》		
《略》			《略》		

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報No. 329」（2024年9月）に掲載される予定です。なお、改訂後の電子添文は弊社ホームページの「医療関係者向けサイト（<https://www.nakakita.co.jp/product/iryokankei/iryokankei.html>）」及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページの「医薬品に関する情報（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）」に掲載されます。また、スマートフォン等のモバイル端末からは添付文書閲覧アプリ「添文ナビ[®]」を利用し、外箱に記載されているGS1バーコードを読み取ることで最新の電子添文が閲覧できます。

トアラセット配合錠「TC」



(01)14987333022325